

COMPTAGE DES OISEAUX D'EAU À LA MI-JANVIER EN FRANCE

Résultats 2024 du comptage Wetlands International



**Place des Lacs de la Forêt d'Orient
parmi les sites Ramsar de France**

**Comptage Wetlands International,
Janvier 2024**

**Réserve naturelle nationale de la
Forêt d'Orient**

En partenariat avec :



Wetlands
INTERNATIONAL



**Agir pour
la biodiversité**

Rédaction : Gaillard S.

Relecture : Delannoy J.

Illustration de couverture : Page de garde du rapport national « Wetlands International 2024 ».


Citation : PNRFO, 2024 – Place des lacs de la Forêt d'Orient parmi les sites Ramsar de France, comptage Wetlands International, Janvier 2024.

Sources : Moussy, C., Quaintenne, G. & Gaudard, C., 2024 – LPO (2024) Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2024 du comptage Wetlands International. LPO BirdLife France - Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 26 pp. & annexes 101 pp., Rochefort

Le site « **Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon** » fait partie du site Ramsar « **Etangs de Champagne Humide** ».

Depuis la création de la Réserve Naturelle Nationale en 2002, le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient participe aux comptages mensuels LPO dont celui de la mi-janvier qui correspond au comptage international des zones humides (Wetlands)

Le site Ramsar « **Etangs de la Champagne Humide** » s'étend des étangs de Belval au nord jusqu'aux lacs aubois au sud. C'est le site continental français le plus important en termes d'effectifs et en nombre d'espèces aviennes patrimoniales présentes en hiver sur le territoire métropolitain.



La convention Ramsar fixe les critères permettant l'identification des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. En particulier, le site Ramsar des Etangs de la Champagne Humide est concerné par les critères 5 (au moins 20 000 oiseaux d'eau) et 6 (au moins 1% de la population biogéographique d'une espèce ou sous-espèce) de la convention.

En janvier 2024, le site Ramsar « **Etangs de la Champagne Humide** » obtient 12 critères internationaux (2^{ème} site français après la Camargue) :

○ > 20 000 oiseaux d'eau	
○ Cygne de Bewick (<i>Cygnus columbianus</i>)	60% de l'effectif national
○ Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	26%
○ Cygne tuberculé (<i>Cygnus olor</i>)	8%
○ Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)	27%
○ Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	2%
○ Canard chipecou (<i>Anas strepera</i>)	10%
○ Canard pilet (<i>Anas acuta</i>)	6%
○ Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)	5%
○ Grande aigrette (<i>Ardea alba</i>)	4%
○ Foulque macroule (<i>Fulica atra</i>)	9%
○ Grand cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	7%



Le site Ramsar « **Etangs de la Champagne Humide** » est constitué de plusieurs sites ornithologiques majeurs (Etangs de Belval, Lac du Der, Etangs de La Horre et Lacs de la Forêt d'Orient).

Le site 10001 « **Lacs : Orient, Amance et Temple-Auzon** » obtient à lui seul 5 critères Ramsar en janvier 2024 (+3 par rapport à 2023). Le site est donc d'importance internationale pour ces 5 critères :

- site abritant plus de **20 000 oiseaux d'eau**
- site abritant plus de 1% des individus d'une population d'une espèce pour :
 - la **Sarcelle d'hiver** : 20 365 individus
 - le **Canard chipeau** : 1 531 individus
 - le **Canard pilet** : 689 individus
 - le **Grand cormoran** : 1 275 individus



Nom français	Effectif national (sites Ramsar)	Effectif national (sites Ramsar)	Site Ramsar ECH	Site Ramsar ECH	Lacs de la Forêt d'Orient		Lacs de la Forêt d'Orient		Record LFO	Année record
OISEAUX	2024	rappel 2023	2024	rappel 2023	2024		rappel 2023			
	France	France	effectif région	Région	effectif lacs	rang national	effectif lacs	rang national		
Cygne de Bewick	566	366	344	272	50	3	97	2	259	2022
Cygne tuberculé	25 650	23 416	2 057	2 466	1 151	5	725	6	1 151	2022
Oie des moissons	2684	2 339	67	46	55	4	46	4	2 050	1978
Oie rieuse	317	328	182	293	-		9	2	450	1978
Oie cendrée	13 115	11 354	1 649	2 962	434	7	479	7	1 788	2014
Canard siffleur	43 400	32 330	5 336	4 868	3 873	2	1 474	5	3 054	2016
Sarcelle d'hiver	201 908	163 200	55 054	37 617	20 365	3	8 731	4	20 007	2016
Canard souchet	63 996	39 456	1 383	558	215	>10	36	>10	1 120	2002
Canard chipeau	34 141	26 895	3 311	6 221	1 531	5	723	7	1 389	2012
Canard colvert	224 704	228 811	7 532	12 890	3 212	10	3 493	>10	6 702	2007
Canard pilet	25 195	15 511	1 578	3 210	689	>10	438	>10	1 109	2019
Nette rousse	5 811	7 804	396	684	51	>10	7	>10	706	2013
Fuligule milouin	46 104	45 406	2 477	4 690	922	>10	96	>10	11 593	2007
Fuligule morillon	27 233	25 781	1 066	1 841	312	>10	24	>10	844	2007
Harle piette	138	109	46	55	1	>10	0		100	1997
Harle bièvre	4 381	3 808	375	268	116	8	123	8	222	2010
Garrot à œil d'or	813	711	145	125	72	3	40	3	111	2013
Macreuse brune	227	219	8	20	4	6	1	>10	15	1997
Grand cormoran	80 540	75 366	5 760	6 935	1 275	8	770	>10	4 934	2022
Grèbe huppé	28 909	27 900	3 068	2 715	1 395	4	1 393	3	4 626	2007
Grande aigrette	8 746	8 626	392	1 132	160	9	129	8	1 304	2024
Héron cendré	11 080	12 004	397	836	133	>10	170	>10	566	2019
Foulque macroule	191 513	189 231	16 310	17 980	5 163	7	2 563	>10	22 342	2018
Grue cendrée	148 680	152 748	38 790	35 503	6 868	>10	1 141	>10	3548(janv)	2014

* Site d'importance internationale

** Site d'importance nationale

Zoom sur 4 espèces classées Ramsar pour les Lacs de la Forêt d'Orient :


Pour ces espèces, une évolution des mœurs, probablement lié aux changements climatiques globaux, à l'évolution de la disponibilité de la ressource alimentaire et potentiellement à l'impact anthropique (dérangement, chasse...), conduit à des changements dans les stratégies d'hivernage. Ainsi, de plus en plus d'espèces d'anatidés tendent à hiverner moins loin, ou plus tard.

Ces suivis réalisés sur le long terme permettent de suivre cette évolution, et dans une certaine mesure d'adapter des pratiques de gestion.

La Sarcelle d'hiver *Anas crecca*


Pour la Sarcelle d'hiver, les effectifs de janvier 2024 sont en augmentation en France et sur les lacs. Le Pnr de la Forêt d'Orient gagne une place au niveau national et se retrouve 3^{ème} site français par ordre d'importance internationale pour l'espèce.

La Réserve naturelle nationale de la Forêt d'Orient abrite un tiers de l'effectif des lacs. Dans le graphe suivant, les maximas annuels sont enregistrés en automne et le record absolu est atteint au comptage de novembre 2020 avec 27 720 individus.



Rassemblement de sarcelles d'hiver, avec fuligues et foulques macroules, F. Croset

Sarcelle d'hiver Maximas lors d'un comptage mensuel sur les Lacs de la Forêt d'Orient



Sarcelle d'hiver, maximas annuels sur les Lacs de la Forêt d'Orient depuis 1993


Le Fuligule milouin *Aythya ferina*

Le Fuligule milouin est en déclin modéré à l'échelle nationale et en fort déclin sur les lacs. Dans la Réserve naturelle nationale de la Forêt d'Orient, le Fuligule milouin ne fréquente que le lac d'Orient. Sur le graphe suivant, on note la baisse régulière (et importante) des effectifs depuis les années 2000, quand les canards utilisaient encore le lac d'Orient comme « site de mue » (période sensible pour les canards qui refont leur plumage).



Fuligules milouin sur les lacs gelés, F. Croset

Fuligule Milouin Maximas lors d'un comptage mensuel sur les Lacs de la Forêt d'Orient



Fuligule milouin, maximas annuels sur les Lacs de la Forêt d'Orient depuis 1993

Le Canard Pilet *Aythya ferina*


Au niveau des effectifs de Canard pilet présents sur les lacs à la mi-janvier, les tendances sont stables à court terme (2012-2024) et en légère progression à long terme (1980-2024), et ceci à l'instar des tendances nationales.

Néanmoins, le critère Ramsar avait été atteint pour la première fois en janvier 2022 avec 1832 individus et de nouveau atteint en 2024 avec 1449 ind.



Canard pilet, F. Croset

Canard Pilet Maximas lors d'un comptage mensuel sur les Lacs de la Forêt d'Orient



Canard pilet, maximas annuels sur les Lacs de la Forêt d'Orient depuis 1993

Le Canard Chipecau *Mareca strepera*


La population régionale hivernante est en nette augmentation, comme elle l'est à long terme en France et en Europe, même si la courbe se stabilise depuis une dizaine d'années.

C'est la première année que les chiffres du Canard chipeau atteignent le seuil Ramsar pour le site des lacs de la Forêt d'Orient.



Canard chipeau, F. Croset

Canard Chipecau Maximas lors d'un comptage mensuel sur les Lacs de la Forêt d'Orient



Canard chipeau, maximas annuels sur les Lacs de la Forêt d'Orient depuis 1993