

REFERENCIAS

1.

Álvarez-Borrego S., Ballesteros-Grijalva

G., y Chee-Barragán A. 1975. Estudio de algunas variables fisicoquímicas superficiales en Bahía San Quintín, en verano, otoño e invierno. *Ciencias Marinas*, 2(2), 1-9.

2.

Álvarez-Borrego, S. 2004. Dinámica de nutrientes y fitoplancton en una laguna costera fuertemente afectada por surgencias costeras. *Ciencias Marinas*, 1-19.

3.

Álvarez-Castañeda S.T. y Ríos E. 2011. Revision of *Chaetodipus arenarius* (Rodentia Heteromyidae), *Zoological Journal of the Linnean Society*, 16(1), 213-228.

4.

CBD.Center for biological diversity. 2018. Endangered species act works. En http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/esa_works/profile_pages/LightFootedClapperRail.htm Última consulta: 28 de agosto de 2018.

5.

Chávez de Nishikawa A. M. y Álvarez-Borrego

S. 1974 Hidrología de la Bahía de San Quintín Baja California, en invierno y primavera. *Ciencias Marinas* 1(2): 31-62.

6.

CONABIO. Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2004. Regiones Terrestres Prioritarias. Escala 1:1000000. México.

7.

COPLADEM. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. IMIP.

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C. 2007.

Programa de Desarrollo Regional: Región San Quintín. Ensenada, B.C. México, 162.

8.

Delgado-González O., Marván-Gargollo F.,

Mejía-Trejo A. y Gil-Silva E. 2012. San Quintin Lagoon Hydrodynamics case study. Water Resources Management and Modelling. Dr. Purna Nayak (Ed.)

9.

Díaz, R. 2017. Hotspots de biodiversidad:

tesoros “preservados”. Bioika, págs. 1-3.

10. Dominguez, R. 2017. Intermareal Rocoso en San Quintín: Una mirada en el tiempo cero. Mediterraneus. 13.

11. Echavarria-Heras, H.A., Solana-Arellano E. y Franco-Vizcaíno E. 2006. The role of increased sea surface temperature on eelgrass leaf dynamics: Onset of El Niño as a proxy for global climate change in San Quintín bay, Baja California. Bulletin of the Southern California Academy of Sciences. 105(3).

12. Eddleman W.R., Knopf F.L.,

Meanley B., Reid F. y Zembal R. 1988. Conservation of North American Rallinds. The Wilson Bulletin, 100(3), 458-475.

13. Galindo-Espinoza D y Palacios E. 2015. Estatus del chorlo nevado (*Charadrius nivosus*) en San Quintín y su disminución poblacional en la península de Baja California. Revista Mexicana de Biodiversidad, 86: 789-798

14. García, E. 1998. Modificaciones al sistema de clasificación de Köppen. Instituto de Geografía-UNAM. México, D.F.

15. González-Bernal M. A. 2009. Cambios en la abundancia y distribución del rascón picudo (*Rallus longirostris* levipes) en Bahía de San Quintín, Baja California, México. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias.

16. García-Esquivel Z., González-Gómez M.A., Ley-Lou F., Mejía-Trejo A. 2004. Potencial ostrícola del brazo oeste de Bahía San Quintín: Biomasa actual y estimación preliminar de la capacidad de carga. Revista Ciencias Marinas. 30 (1A):

17. González-Abraham C.E., Garcillán P.P., Ezcurra E. 2010. Ecorregiones de la península de Baja California: una síntesis. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 87:69-82
18. Hernández-Ayón J.M., Galindo-Bect M.S., Camacho-Ibar V., García-Esquivel Z., González-Gómez M.A., Ley-Lou F. 2004. Dinamica de los nutrientes en el brazo oeste de Bahía San Quintín, Baja California, México, durante y después de El Niño 1997/1998. Revista Ciencias Marinas, 30 (1A) : 119-132.
19. INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Conabio. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ine. Instituto Nacional de Ecología. 2008. Ecorregiones Terrestres de México. Escala 1:1000000. México.
20. IUCN. Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En <https://www.iucnredlist.org/> Ultima consulta : 26 de agosto de 2018.
21. Morrone J.J. 2005. Hacia una síntesis biogeográfica de México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 76 (2). 207-252.
22. Page G.W., Palacios E., Alfaro L. Gonzalez S., Stenzel L, E, y Jungers M. 1997. Numbers of wintering shorebirds in coastal wetlands of Baja California, Mexico. Journal of Field Ornithology, 516-574.
23. Page G.W., Shuford W.D., Kjelson J.E., y Stenzel L.E: 1992. Shorebird numbers in wetlands of the pacific flyway a summary counts from april 1988 to january 1992. Report of Point Reyes Bird Observatory, Stinson Beach, CA.
24. Palacios et al. 2018. Pacific Brant mid-winter ground surveys in Mexico (2018). Unpubl. Progress Report to U.S. Fish and Wildlife

Service. La Paz, Baja California

Sur. 14 pp.

25. RHRAP. Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. 2009. Proyecto de recuperación de aves playeras en el noroeste de México. Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

26. Spalding

M.D., Fox H.E., Allen G.R., Davidson N., Ferdaña Z.A., Finlayson M., Halpern B.S., Jorge M.A., Lombana Al., Lourie S.A., Martin K.D., McManus E., Molnar J., Recchia C.A., Roberston J. 2007. Marine ecoregions of the world: a bioregionalization of coastal and shelf areas. A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas, BioScience, 57 (7): 573–583.

27. TNC. The Nature Conservancy.

USDA Forest Service and U.S. Geological Survey, based on Bailey R. G. 1995.

Description of the ecoregions of the United States (2nd ed.). Misc.

Pub. No. 1391. Map Scale 1 :7,500,000. USDA Forest Service. 108.

28. Udvardy, M. D. Udvardy

M.D.F.1975. A classification of the biogeographic provinces of the world: prepared as contribution to UNESCO's Man and the Biosphere Programme. IUCN Occasional Paper no. 18. International

Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Morges, Switzerland.

29. Vanderplank, S. E. 2011. The Flora of Grater San Quintín, Baja

California, México (2005-2010). Aliso: A. Journal of

Systematic and Evolutionary Botany, 29 (2)

65-103.

30. Watson, E.B., e Hinojosa- Corona A. 2007. Assessment of Blue Carbon Storage by Baja California (Mexico) Tidal Wetlands and Evidence for Wetland Stability in the Face of Anthropogenic and Climatic Impacts. Sensors, 18(1),

32. doi:10.3390/s18010032 www.mdpi.com/journal/sensors

31. Zembal R., Hoffman S., y Konecny J.2015. Status and Distribution of the Light-footed

Ridway's (Clapper) Rail in California 2016 season.

32. Zembal, R. y Massey B.W.

1981. A census of the light-footed clapper rail in California. *Western Birds*. 12 :89-99.

33. Ebird. 2018. Listado de conteo máximo de aves en la Bahía de San Quintín. The Cornell Lab of ornithology. En <https://ebird.org/hotspot/L586464?yr=all&m=&rank=hc> Ultima consulta: 26 de octubre de 2018.

1. Abell R., Thieme M.L., Revenga C., Bryer M., Kottelat M., Bogutskaya N., Coad B., Mandrak N., Contreras-Balderas S., Bussing W., Stiassny M.L.J., Skelton P., Allen G.R. Unmack P., Naseka A., Ng R., Sindorf N., Robertson J., Armjio E., Higgins J.V., Heibel T.J., Wikramanayake E., Olson D., López H.L., Reis R.E., Lundberg J.G., Sabaj Pérez M.H., y Petry P. 2008. Freshwater Ecoregions of the World : A New Map of Biogeographic Units for Freshwater Biodiversity Conservation. *Bioscience*. 5 :403-414.

2. Aguilar-Rosas, L. 2005. Macroalgas marinas de la Bahía de San Quintín, Baja California, México. *Polibotánica*. (19).

3. Álvarez-Borrego S., Ballesteros-Grijalva G., y Chee-Barragán A. 1975. Estudio de algunas variables fisicoquímicas superficiales en Bahía San Quintín, en verano, otoño e invierno. *Ciencias Marinas*, 2(2), 1-9.

4. Álvarez-Borrego, S. 2004. Diminución de nutrientes y fitoplancton en una laguna costera fuertemente afectada por surgencias costeras. *Ciencias Marinas*, 1-19.

5. Álvarez-Castañeda S.T. y Rios E. 2011. Revision of *Chaetodipus arenarius* (Rodentia Heteromyidae), *Zoological Journal of the Linnean Society*, 16(1), 213-228.

6. CBD.Center for biological diversity. 2018. Endangered species act works. En http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/esa_works/profile_pages/LightFootedClapperRail.htm Ultima consulta: 28 de agosto de 2018.

7. Chávez de Nishikawa A. M. y Álvarez-Borrego S. 1974 Hidrología de la Bahía de San Quintín Baja California, en invierno y primavera. *Ciencias Marinas* 1(2): 31-62.

8. CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2018. Naturalista: Rascón picudo. En: <https://www.naturalista.mx/taxa/179819-Rallus-obscurus-levipes>. Ultima consulta: 17 de junio de 2018.

9. CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 1998. Regiones Marinas Prioritarias de México. Escala 1:4000000. México. Financiado por -USAID-Packard Foundation-CONABIO-WWF-FMCN.

10. CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2004. Regiones Terrestres Prioritarias. Escala 1:1000000. México.

11. COPLADEM. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. IMIP. Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, B.C. 2007. Programa de Desarrollo Regional: Región San Quintín. Ensenada, B.C. México, 162.
12. Delgadillo J. 1997. Florística y ecología de Baja California: Ensenada, B.C. Universidad Autónoma de Baja California.
13. Delgado-González O., Marván-Gargollo F., Mejía-Trejo A. y Gil-Silva E. 2012. San Quintin Lagoon Hydrodynamics case study. Water Resources Management and Modelling. Dr. Purna Nayak (Ed.)
14. Díaz, R. 2017. Hotspots de biodiversidad: tesoros “preservados”. Bioika, págs. 1-3.
15. Dominguez, R. 2017. Intermareal Rocoso en San Quintín: Una mirada en el tiempo cero. Mediterraneus. 13.
16. Ebird. 2018. Listado de conteo máximo de aves en la Bahía de San Quintín. The Cornell Lab of ornithology. En <https://ebird.org/hotspot/L586464?yr=all&m=&rank=hc> Ultima consulta: 26 de octubre de 2018.
17. Echavarria-Heras, H.A., Solana-Arellano E. y Franco-Vizcaíno E. 2006. The role of increased sea surface temperature on eelgrass leaf dynamics: Onset of El Niño as a proxy for global climate change in San Quintín bay, Baja California. Bulletin of the Southern California Academy of Sciences. 105(3).
18. Eddleman W.R., Knopf F.L., Meanley B., Reid F. y Zembal R. 1988. Conservation of North American Rallinds. The Wilson Bulletin, 100(3), 458-475.
19. Galindo-Espinoza D y Palacios E. 2015. Estatus del chorlo nevado (*Charadrius nivosus*) en San Quintín y su disminución poblacional en la península de Baja California. Revista Mexicana de Biodiversidad, 86: 789-798
20. García, E. 1998. Modificaciones al sistema de clasificación de Köppen. Instituto de Geografía-UNAM. México, D.F.
21. González-Bernal M. A. 2009. Cambios en la abundancia y distribución del rascón picudo (*Rallus longirostris levipes*) en Bahía de San Quintín, Baja California, México. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias.
22. García-Esquivel Z., González-Gómez M.A., Ley-Lou F., Mejía-Trejo A. 2004. Potencial ostrícola del brazo oeste de Bahía San Quintín: Biomasa actual y estimación preliminar de la capacidad de carga. Revista Ciencias Marinas. 30 (1A): 61-74
23. González-Abraham C.E., Garcillán P.P., Ezcurra E. 2010. Ecorregiones de la península de Baja California: una síntesis. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 87:69-82
24. Hernández-Ayón J.M., Galindo-Bect M.S., Camacho-Ibar V., García-Esquivel Z., González-Gómez M.A., Ley-Lou F. 2004. Dinamica de los nutrientes en el brazo oeste de Bahía San Quintín, Baja California, México, durante y después de El Niño 1997/1998. Revista Ciencias Marinas, 30 (1A) : 119-132.

25. INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Conabio. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ine. Instituto Nacional de Ecología. 2008. Ecorregiones Terrestres de México. Escala 1:1000000. México.
26. IUCN. Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En <https://www.iucnredlist.org/> Ultima consulta : 26 de agosto de 2018.
27. Massey B. W. y E. Palacios. 1994. Avifauna of the wetlands of Baja California, Mexico: current status. *Studies in Avian Biology*, 15: 45-57.
28. Morrone J.J. 2005. Hacia una síntesis biogeográfica de México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 76 (2). 207-252.
29. Page G.W., Palacios E., Alfaro L. Gonzalez S., Stenzel L, E, y Jungers M. 1997. Numbers of wintering shorebirds in coastal wetlands of Baja California, Mexico. *Journal of Field Ornithology*, 516-574.
30. Page G.W., Shuford W.D., Kjelson J.E., y Stenzel L.E: 1992. Shorebird numbers in wetlands of the pacific flyway a summary counts from april 1988 to january 1992. Report of Point Reyes Bird Observatory, Stinson Beach, CA.
31. Palacios et al. 2018. Pacific Brant mid-winter ground surveys in Mexico (2018). Unpubl. Progress Report to U.S. Fish and Wildlife Service. La Paz, Baja California Sur. 14 pp.
32. Pro Esteros Marismas y Lagunas de las Californias, S.C . 2000. Plan de Manejo para actividades Acuícolas, Pesqueras y Ecoturísticas de Bahía San Quintín, B.C. Ensenada, BCRosales, C.J. 1996. Ictiofauna de la Bahía de San Quintín, Baja California, México y su costa adyacente. *Ciencias Marinas*. 443-458
33. RHRAP. Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. 2009. Proyecto de recuperación de aves playeras en el noroeste de México. Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
34. RHRAP. Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. 2018. Complejo Lagunar San Quintín. En <https://www.whsrn.org/complejo-lagunar-san-quintin> Última consulta: 26 de Octubre de 2018.
35. Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2019. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2019. Diario Oficial de la Federación. 5 de Noviembre de 2022.
36. Spalding M.D., Fox H.E., Allen G.R., Davidson N., Ferdaña Z.A., Finlayson M., Halpern B.S., Jorge M.A., Lombana Al., Lourie S.A., Martin K.D., McManus E., Molnar J., Recchia C.A., Roberston J. 2007. Marine ecoregions of the world: a bioregionalization of coastal and shelf areas. *A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas, BioScience*, 57 (7): 573–583.
37. Terra Peninsular A.C.2014. Estrategias de conservación para los acuerdo de destino, concesiones de la ZOFEMAT y áreas destinadas voluntariamente a la conservación en la Bahía de San Quintín y Valle Tranquilo. Ensenada, Baja California.

38. Terra Peninsular A.C. 2017. Ficha Técnica de : rata canguro de San Quintín. En <http://terrapeninsular.org/wp-content/uploads/2018/04/Ficha-t%C3%A9cnica-de-la-rata-canguro-de-San-Quint%C3%ADn.pdf> Última consulta : 29 de octubre de 2018.
39. TNC. The Nature Conservancy. USDA Forest Service and U.S. Geological Survey, based on Bailey R. G. 1995. Description of the ecoregions of the United States (2nd ed.). Misc. Pub. No. 1391. Map Scale 1 :7,500,000. USDA Forest Service. 108.
40. Udvardy, M. D. Udvardy M.D.F.1975. A classification of the biogeographic provinces of the world: prepared as contribution to UNESCO's Man and the Biosphere Programme. IUCN Occasional Paper no. 18. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Morges, Switzerland.
41. Vanderplank, S. E. 2011. The Flora of Grater San Quintín, Baja California, México (2005-2010). *Aliso: A. Journal of Systematic and Evolutionary Botany*, 29 (2) 65-103.
42. Watson, E.B., e Hinojosa- Corona A. 2007. Assessment of Blue Carbon Storage by Baja California (Mexico) Tidal Wetlands and Evidence for Wetland Stability in the Face of Anthropogenic and Climatic Impacts. *Sensors*, 18(1), 32. doi:10.3390/s18010032 www.mdpi.com/journal/sensors
43. Zembal R., Hoffman S., y Konecny J.2015. Status and Distribution of the Light-footed Ridway's (Clapper) Rail in California 2016 season.
44. Zembal, R. y Massey B.W. 1981. A census of the light-footed clapper rail in California. *Western Birds*. 12 :89-99.