

The website encountered an unexpected error. Try again later.

Codes couleur

Les champs qui sont ombrés en bleu clair concernent des données et informations uniquement requises en cas de mise à jour de la FDR.

Veillez noter que certains champs concernant des aspects de la Partie 3, la Description des Caractéristiques Ecologiques de la FDR (ombrés en mauve) ne doivent pas être remplis dans le cadre d'une FDR normale; ils sont inclus par souci d'exhaustivité, pour assurer la cohérence voulue entre la FDR et la Description des caractéristiques écologiques 'complète' adoptée dans la Résolution X.15 (2008). Si une Partie contractante ne dispose pas d'informations pertinentes pour ces champs (par exemple issues d'une description nationale des caractéristiques écologiques), elle peut, si elle le souhaite, inclure des informations dans ces champs additionnels

1 - Résumé

Résumé

Le site est composé de deux entités étroitement liées qui sont : la forêt classée du barrage de Ouagadougou (FCBO) abritant le Parc Urbain Bāngr – Weoogo (PUBW) et les barrages n°1, n°2 et n°3 de la ville de Ouagadougou.

Le PUBW, est un véritable laboratoire à ciel ouvert, un poumon vert pour la capitale. Il crée un microclimat en saison chaude, et un ombrage de rencontres sociales. C'est pourquoi il attire 400 à 1 600 visiteurs par jour soit environ 25 000 visiteurs par an.

Il est pris d'assaut pendant les weekend pour la pratique du sport et le pique-nique en particulier pendant la période chaude (mars à mai).

Restaurée et protégée, la gestion de ce poumon vert a été rétrocédée à la commune de Ouagadougou par le ministère de l'environnement en 2001.

Lieu de préservation du potentiel environnemental, le PUBW est aujourd'hui un lieu de production végétale et animale de certaines espèces en voie de disparition. " Bāngr – Weoogo " est un laboratoire scientifique, un modèle dans la sous-région, où des étudiants sont envoyés pour leur formation". A l'intérieur de cet espace vert, des efforts d'aménagement et de protection de cette forêt offrent à première vue, des ouvrages de franchissement, des pistes pour piétons et cyclables, des aires gazonnées, des puits à grand diamètre, des aires de jeux, etc. Ce parc urbain incarne également des croyances traditionnelles. Dans la rivière sacrée de ce bois (le Kugri-suingo), cohabitent des espèces sacrées telles que le varan, le python et le crocodile, ce qui confère à ce joyau communal, son caractère socioculturel et scientifique. Les trois barrages ont été réalisés en 1954 avec une capacité initiale de stockage estimée à 14 960 000 m3 d'eau. L'objectif était d'approvisionner la population de Ouagadougou en eau potable. Environ 5.500.000 m3 étaient exploités par l'ONEA (Office National de l'Eau et de l'Assainissement) pour alimenter la ville de Ouagadougou. Depuis la mise en service des stations de Ziga en 2004, les barrages de Ouagadougou étaient exploités en appoint de janvier à mai (environ 1 000 000 m3 /an). De nos jours, ils sont exploités par les entreprises de Bâtiments et travaux publics.

2 - Données et localisation

2.1 - Données officielles

2.1.1 - Nom et adresse du compilateur de cette FDR

Compilateur responsable

Institution/agence	Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD)
Adresse postale	SP-CNDD, 01 BP 6486 Ouagadougou 01

Autorité Administrative nationale Ramsar

Institution/agence	Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD)
Adresse postale	SP-CNDD, 01 BP 6486 Ouagadougou 01

2.1.2 - Période de collecte des données et des informations utilisées pour compiler la FDR

Depuis l'année	1984
Jusqu'à l'année	2025

2.1.3 - Nom du Site Ramsar

Nom officiel (en anglais, français ou espagnol)	Complexe du Parc Urbain Bāngr – Weoogo et du lac des trois barrages
---	---

2.1.4 - Changements dans les limites et la superficie du site depuis l'inscription ou depuis la mise à jour précédente

(Mise à jour) A. Changements aux limites du site	Oui ☐ Non ☒
(Mise à jour) B. Changements à la superficie du site	Aucun changement à la superficie
(Mise à jour) For secretariat only: This update is an extension	☐

2.1.5 - Changements dans les caractéristiques écologiques du site

(Mise à jour) 6b i. Les caractéristiques écologiques du Site Ramsar (y compris les critères applicables) ont-elles changé depuis la FDR précédente?	Une partie
(Mise à jour) Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations	
Des efforts de conservation ont été consentis et cela a entraîné une amélioration des caractéristiques écologiques du site.	

2.2 - Localisation du site

2.2.1 - Définir les limites du site

b) Carte/image numériques
<1 fichier(s)>

Former maps	0
-------------	---

Description des limites

Le site est composé de deux entités étroitement liées qui sont : la forêt classée du barrage de Ouagadougou (FCBO) abritant le Parc Urbain Bāngr – Weoogo (PUBW) et les barrages n°1, n°2 et n°3 de la ville de Ouagadougou.
Le site Ramsar fait frontière avec les arrondissements 2, 3, 4, 5 et 10 de la commune de Ouagadougou.
Au niveau de l'entité barrage, les limites sont celles des digues d'une part et des berges d'autre part. Le barrage n°1 est séparé du n°2 par un échangeur sur lequel passe la route nationale N°2 Ouagadougou – Ouahigouya et la route nationale N°22 Ouagadougou-Kongoussi ; le barrage n°2 est séparé du n°3 par un pont sur lequel traverse la route de Tanguin (un quartier de la ville de Ouagadougou).
Le barrage n°3 est séparé du parc par un pont sur lequel passe la route nationale N°3 Ouagadougou – Dori.
L'entité Parc Urbain Bāngr Weoogo est protégée par une clôture qui constitue en même temps ses limites.

2.2.2 - Emplacement général

a) Dans quelle grande région administrative se trouve le site?	Région du Kadiogo
--	-------------------

b) Quels sont la ville ou le centre de population les plus proches?

Ouagadougou (Région du Kadiogo)

2.2.3 - Pour les zones humides situées sur des frontières nationales seulement

a) La zone humide s'étend-elle sur le territoire d'un ou de plusieurs autres pays? Oui ☐ Non ☒

b) Le site est-il adjacent à un autre Site Ramsar inscrit qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante? Oui ☐ Non ☒

2.2.4 - Superficie du site

Superficie officielle, en hectares (ha): 945

Superficie en hectares (ha) telle que calculée d'après les limites SIG 945.321

2.2.5 - Biogéographie

Régions biogéographiques

Système(s) de régionalisation	Région biogéographique
Provinces biogéographiques d'Udvardy	Afrotropical

Autre système de régionalisation biographique

Selon GUINKO et FONTES (1995), le territoire du Burkina Faso est divisé en deux (02) domaines phytogéographiques. Chaque domaine est subdivisé en secteurs et chaque secteur en district : ce découpage est basé sur le climat et les éléments de la flore. Ce sont :

- le domaine sahélien qui comprend les secteurs suivants :
 - secteur sahélien strict ou nord sahélien ;
 - secteur sub – sahélien
- le domaine soudanien subdivisé comme suit :
 - secteur nord soudanien auquel appartient le site Ramsar;
 - le sud soudanien ou méridional qui est subdivisé en district.

3 - Pourquoi le site est-il important?

3.1 - Critères Ramsar et leur justification

☒ Critère 1: Types de zones humides naturels ou quasi naturels représentatifs, rares ou uniques

Services hydrologiques fournis

La rivière sacrée (le Kugri-suingo), est un cours d'eau permanent dans le site. Elle regorge d'eau en saison sèche et permet de recharger les autres points d'eau, ce qui permet la survie des espèces aquatiques et terrestres.

Autres services écosystémiques fournis

La rivière sacrée est très importante pour les communautés riveraines pour ces caractéristiques culturelles. Elle incarne des croyances traditionnelles. C'est ainsi qu'à l'approche de chaque saison hivernale, une cérémonie coutumière (le sigri-maogo), a lieu pour demander aux ancêtres d'intercéder auprès de Dieu pour la santé, le bonheur, la paix et une bonne pluviométrie au Burkina. Ce rite, qui consacre le sacrifice de poulets et de moutons dans ce "lieu saint" est également une occasion pour de nombreuses personnes de formuler des vœux particuliers.

☒ Critère 2: Espèces rares et communautés écologiques menacées

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Au cœur de Ouagadougou, le Parc Urbain Bangr-Weoogo abrite une biodiversité remarquable avec des habitats diversifiés (savanes, forêts, mares). C'est un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales menacées au plan mondial et/ou national. Au titre de ces espèces animales on peut citer : Trionyx cyclanorbis (tortue), Varanus niloticus (Varan du Nil), Varanus exanthematicus (Varan de savane), Pteropus conspicillatus (roussette), Crocodylus Suchus (crocodile), Oreochromis niloticus (Carpe). Les espèces végétales menacées sont : Khaya senegalensis (Caïcédra), Mitragyna inermis, Anogeissus leiocarpus (Bouleau d'Afrique), Vitellaria paradoxa (karité), Lannea microcarpa (raisinier).

☒ Critère 3: Diversité biologique

Justification	Le site revêt une flore relativement riche avec 337 espèces réparties en 301 genres et 70 familles dont 98 espèces, 66 genres, et 33 familles pour la flore ligneuse. Les herbacées sont réparties en 239 espèces, 148 genres et 46 familles BELEM/OUEDRAOGO, 1997. En se basant sur la physiologie d'ensemble du parc, GNOUMOU, 2007 a distingué six (06) formations végétales allant de forêt claire aux savanes arbustives. Douze espèces de mammifères ont été recensées notamment (Hippopotamus amphibius, (Linnaeus, 1758), Hippotragus equinus (Desmarest 1804 ; Kobus ellipsiprymnus (Ogilby 1833), Tragelaphus scriptus (Pallas 1766, Hyaena hyaena (Linnaeus, 1758), Chlorocebus sabaeus (Linnaeus 1766), Genetta maculata (Gray, 1830), Lepus saxatilis (Cuvier 1823), Xerus erythropus E. Geoffroy Saint-Hilaire ; Eidolon helvum Kerr, Atelerix albiventris Wagner 1841), Papio anubis (Lesson, 1827) dans la Forêt Classée du Barrage de Ouagadougou, ont été recensées en 2021. Plusieurs espèces de reptiles ont été observées dans la Forêt Classée du Barrage de Ouagadougou, soit dans la nature soit en captivité dans la ménagerie du parc notamment Python sebae (Gmelin, 1789), Crocodylus suchus (Geoffroy, 1807) , Varanus niloticus (Linnaeus, 1766) et Centrochelys sulcata (Miller, 1779). Parmi celles-ci, Crocodylus suchus et Varanus niloticus se distinguent par une présence particulièrement marquée durant la saison des pluies. Les inventaires de l'avifaune réalisés en 2025 dans la Forêt Classée du Barrage de Ouagadougou mettent en évidence une forte présence de l'avifaune. Au total, 161 espèces d'oiseaux ont été recensées, réparties entre 120 genres et 59 familles (PAF-2025). La communauté aviaire est largement dominée par des espèces telles que Laniarius barbarus (Gonolek de Barbarie), Vidua chalybeata (Combassou du Sénégal), Spilopelia senegalensis (Tourterelle maillée) et Crinifer piscator (Touraco gris). La forêt classée du barrage de Ouagadougou reste un des derniers refuges du Vautour charognard (Necrosystes monachus, Temminck, 1823), une espèce en danger critique d'extinction. On note également la présence d'oiseaux migrateurs du paléarctique occidentale et de la région afrotropicale au niveau de la forêt et du lac des trois barrages. La diversité ichthyologique est faible avec seulement 31 espèces identifiées (Ouédraogo, 2016). Des espèces telles que Clarias senegalensis (silures ou poisson-chat), Polypterus endlicheri, Barbus Enteromius ablabes , Barbus macrops, Coptodon zillii, Sarotherodon galilaeusProtopterus annectens (dipnuste africain), Tilapia sp et quelques formes naines de Cyprinidae sont couramment rencontrées.
---------------	--

☒ Critère 4: Habitat pour un stade critique du cycle et de vie ou lors de conditions difficiles

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations	C'est un site d'accueil d'oiseaux migrateurs (33 espèces d'oiseaux migrateurs). Le site abrite également une des espèces d'avifaune menacées (en danger critique d'extinction) qu'est le vautour charognard (Necrosystes monachus).
---	--

3.2 - Espèces végétales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	Critère 2	Critère 3	Critère 4	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	Autre statut	Justification Justification
Plantae								
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Bombax costatum</i>	☐	☒	☐	LC	☐	Espèce menacée au Burkina Faso et intégralement protégée par l'Arrêté n° 2004_019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulières	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Detarium microcarpum</i>	☐	☒	☐	LC	☐		Fruits très fortement exploités par élagage. Bois également très exploité comme bois de feu
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Khaya senegalensis</i>	☒	☒	☐	VU	☐		Peuplement naturel vieillissant de la ville de Ouagadougou
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Parkia biglobosa</i>	☐	☒	☐	LC	☐	Espèce menacée au Burkina Faso et intégralement protégée par l'Arrêté n° 2004_019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulières	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Pterocarpus erinaceus</i>	☐	☐	☐	EN	☐	Espèce menacée au Burkina Faso et intégralement protégée par l'Arrêté n° 2004_019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulières	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Terminalia leiocarpa</i>	☐	☐	☐	LC	☐	Espèce menacée au Burkina Faso et intégralement protégée par l'Arrêté n° 2004_019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulières	
TRACHEOPHYTA/ MAGNOLIOPSIDA	<i>Vitellaria paradoxa</i>	☒	☒	☐	VU	☐	Espèce menacée au Burkina Faso et intégralement protégée par l'Arrêté n° 2004_019/MECV portant détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulières	Peuplement naturel vieillissant de la ville de Ouagadougou

Le Complexe des trois barrages et du Parc Urbain Bāngr – Weoogo regorge de nombreuses espèces végétales qui ont une importance internationale soit en raison des menaces qui pèsent sur elles (Liste rouge de l'IUCN), soit à cause des nombreux biens et services qu'elles rendent aux populations. Il s'agit entre autres de *Vitellaria paradoxa* (karité), *Parkia biglobosa* (néré), *Lannea microcarpa* (Raisinier), *Khaya senegalensis* (caïcedrat), *Anogeissus leiocarpus*, *Saba senegalensis*, etc. qui sont menacés au plan mondial et ou national.

3.3 - Espèces animales dont la présence explique l'importance internationale du site

Phylum	Nom scientifique	L'espèce justifie le critère				L'espère contribue au critère				Taille pop.	Période de Est. pop.	% occurrence 1)	UICN Liste rouge	CITES Annexe I	CMS Annexe I	Autre statut	Justification
		2	4	6	9	3	5	7	8								
Autres																	
CHORDATA/ TESTUDINES	<i>Centrochelys sulcata</i>	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				EN	☐	☐		
CHORDATA/ ACTINOPTERYGII	<i>Clarias gariepinus</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/ REPTILIA	<i>Crocodylus suchus</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
CHORDATA/ MAMMALIA	<i>Hippopotamus amphibius</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☐	☐	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
CHORDATA/ MAMMALIA	<i>Hippotragus equinus</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/ MAMMALIA	<i>Kobus ellipsiprymnus defassa</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				NT	☐	☐	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
CHORDATA/ ACTINOPTERYGII	<i>Lates niloticus</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐		
CHORDATA/ MAMMALIA	<i>Lepus saxatilis</i>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐				LC	☐	☐	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
CHORDATA/ REPTILIA	<i>Python sebae</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				NT	☐	☐	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
Oiseaux																	
CHORDATA/ AVES	<i>Aquila rapax</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☐	☐		
CHORDATA/ AVES	<i>Butastur rufipennis</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				LC	☐	☐	Migrant intra-africain, Période de migration: Septembre-Mars (vers le sud), Avril-Septembre (vers le nord)	
CHORDATA/ AVES	<i>Calidris ferruginea</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				VU	☐	☐		
CHORDATA/ AVES	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐	Paléarctique migrant, Période de migration: Août-Octobre (automne), Mars-Mai (printemps)	
CHORDATA/ AVES	<i>Circus macrourus</i>	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐				NT	☐	☐	Paléarctique migrant, Période de migration: Septembre-Octobre (automne), Avril-Mai (printemps)	
CHORDATA/ AVES	<i>Necrosyrtes monachus</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				CR	☐	☒	Espèces protégées au niveau national selon le décret n°2017-0238-PRES-PM-MEEVCC	
CHORDATA/ AVES	<i>Polemaetus bellicosus</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				EN	☐	☐		

1) Pourcentage de la population biogéographique totale dans le site

Hormis les animaux sauvages introduits, les animaux rencontrés sont de la petite faune. Ce sont notamment les écureuils, les rats, les lièvres, etc. Cependant quelques grands ovipares aquatiques abritent les mares et le canal de la forêt : crocodiles et tortues. On note aussi la présence remarquable des varans, et d'une importante faune aviaires telle que les pintades sauvages, les francolins. On y observe aussi l'existence d'une grande population de roussettes migratrices qui y séjournent chaque année entre juin et octobre.

3.4 - Communautés écologiques dont la présence explique l'importance internationale du site

Nom de la communauté écologique	La communauté satisfait-elle au Critère 2?	Description	Justification
Communautés végétales	☒	Elles sont composées de <i>Khaya senegalensis</i> , <i>Mitragyna inermis</i> , <i>Anogeissus leiocarpus</i> , <i>Vitellaria paradoxa</i> , <i>Lanea microcarpa</i>	L'importance internationale du site s'explique par le fait que ces communautés sont composées d'espèces menacées au plan national et mondial et procure de nombreux biens et services écosystémiques aux populations
Communautés Animales	☒	Elles se composent de <i>Tryonix cyclanorbis</i> , <i>Varanus niloticus</i> , <i>Varanus exanthematicus</i> , <i>Pteropus consticillatus</i> , <i>Crocodile niloticus</i> , <i>Oreochromis niloticus</i>	Ces communautés sont menacées au plan international et le site constitue un lieu de refuge pour elles.

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Les activités anthropiques illicites dans le complexe affectent les communautés écologiques de façon complexe. On assiste à une mortalité des ligneux du parc due à des inondations et la stagnation des eaux pluviales.

La composante herbacée se répartit en quatre (4) groupements :

- Groupement à *Amorphophallus abyssinicus* : Il est caractéristique des zones denses du parc (savanes boisées et forêts claires) et aussi des zones drainées. Les espèces différentielles de ce groupement sont *Amorphophallus abyssinicus* et *Dioscorea bulbifera*.
- Groupement à *Hygrophila auriculata* : Il est discriminé par des espèces qui lui sont presque caractéristiques. Ce sont : *Hygrophila auriculata*, *Luffa cylindrica*, *Merremia herderacea*, *Dyschoriste perrottetii*, *Ipomoea aquatica*, *Oryza barthii*. Ce groupement se rencontre dans la zone marécageuse et les zones inondables.
- Groupement à *Aspilia paludosa* : *Aspilia paludosa* est la seule espèce différentielle de ce groupement. Il s'installe sur des sols à une texture sablo-limoneuse en surface.
- Groupement à *Microchloa indica* : Le tapis herbacé à *Microchloa indica*, se rencontre dans les savanes arbustives du parc. Les espèces différentielles du groupement sont : *Microchloa indica*, *Lepidagathis collina*, *Loudetia togoensis*. Le groupement est présent essentiellement sur des sols superficiels et gravillonnaires. Il constitue le tapis herbacé des peuplements à *Acacia dudgeoni*.

4 - Comment est le site? (Description des caractéristiques écologiques)

4.1 - Caractéristiques écologiques

Le complexe rend des services écosystémiques inestimables aux populations de la capitale burkinabè et celle d'ailleurs. Le Parc Urbain Bāngr Weoogo revêt une flore relativement riche avec 337 espèces réparties en 301 genres et 70 familles dont 98 espèces, 66 genres, et 33 familles pour la flore ligneuse. Les herbacées sont réparties en 239 espèces, 148 genres et 46 familles BELEM/OUEDRAOGO (M.), 1997. En se basant sur la physionomie d'ensemble du parc, GNOUMOU (A.), 2007 a distingué six (06) formations végétales allant de forêt claire aux savanes arbustives.

Le parc est un site touristique par excellence aussi bien pour la population de la ville que pour les étrangers. C'est un lieu de préservation du potentiel environnemental, le PUBW est aujourd'hui un lieu de production végétale et animale de certaines espèces en voie de disparition. Le site est un laboratoire scientifique, un modèle dans la sous-région, où des étudiants sont envoyés pour leur formation. Il faut aussi souligner la présence des mares qui constituent des biotopes pour les crocodiles, les tortues et les poissons.

Quant aux barrages, leur première vocation était de desservir la ville en eau potable. Depuis la mise en place de la station de Ziga en 2004, les barrages de Ouagadougou étaient exploités en appoint de janvier à mai avec une quantité de prélèvement annuelle estimée à 1 000 000 m³. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, le site est l'objet de convoitises en raison des nombreux biens et services écosystémiques qu'il procure aux milliers de populations riveraines en termes d'alimentation, de santé, d'énergie, de satisfaction des besoins culturels, culturels, etc.

La forte sollicitation de cet écosystème humide par les populations pour la satisfaction de besoins divers et surtout l'exploitation non durable qu'elles en font, constituent en plus des changements climatiques, une des menaces majeures aux caractéristiques écologiques du site.

4.2 - Quel(s) type(s) de zones humides se trouve(nt) dans le site?

Zones humides continentales

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide	Justification du Critère 1
Eau douce > Lacs et mares >> P: Lacs d'eau douce saisonniers/ intermittents	Kugri-suingo	3		Rare

Zones humides artificielles

Types de zones humides (code et nom)	Nom local	Classement de l'étendue (ha) (1: la plus grande - 4: la plus petite)	Superficie (ha) du type de zone humide
6: Zones de stockage de l'eau/ réservoirs	barrages	2	303

Autres habitats qui ne sont pas des zones humides

Autres habitats qui ne sont pas des zones humides dans le site	Superficie (ha) si connue
Parc Bangr-weogo	265

(ECD) Connectivité de l'habitat

Le complexe est drainé par une rivière qui se jette dans le massili, un affluent du Nakanbé

4.3 - Éléments biologiques

4.3.1 - Espèces végétales

Autres espèces de plantes remarquables

Phylum	Nom scientifique	Position dans l'aire de répartition / endémisme / autre
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Adansonia digitata</i>	savane claire
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Ceiba pentandra</i>	forêt galerie
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Commiphora africana</i>	savane arborée
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Crossopteryx febrifuga</i>	savane arborée
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Diospyros mespiliformis</i>	forêt galerie
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Kigelia africana</i>	
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Lannea microcarpa</i>	savane arborée
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Mitragyna inermis</i>	forêt galerie
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Securidaca longepedunculata</i>	
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Vitex doniana</i>	savane arborée

Espèces de plantes exotiques envahissantes

Phylum	Nom scientifique	Impacts	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
TRACHEOPHYTA/MAGNOLIOPSIDA	<i>Azadirachta indica</i>	Actuellement (impacts mineurs)	Aucun changement
TRACHEOPHYTA/LILIOPSIDA	<i>Eichhornia crassipes</i>	Actuellement (impacts majeurs)	Aucun changement

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Le site héberge des espèces rares ou ayant disparu dans les biocénoses environnantes. Des espèces telles que *Boswellia dalzielii*, *Andira inermis*, *Kigelia africana*, *Flacourtia flavescens* y sont bien présentes alors qu'elles ont disparu des zones environnantes. Même si ces espèces ont été introduites de nouveau par l'Homme, elles y trouvent un habitat convenable pour reconstituer leurs populations respectives. Les berges des barrages sont le siège d'une activité intense de maraîchage, et des points de déjections ou d'abandons des déchets. Cela entraîne une prolifération rapide de la jacinthe d'eau (espèce exotique importée) au niveau des barrages dues à la richesse des nutriments, et aussi au climat favorable. Ces espèces envahissantes affectent négativement la qualité des ressources en eau

4.3.2 - Espèces animales

Autres espèces animales remarquables

Phylum	Nom scientifique	Période d'est. de pop	% occurrence	Position dans aire de répartition /endémisme/autre
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Eidolon helvum</i>			
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Epomophorus gambianus</i>			
CHORDATA/AMPHIBIA	<i>Hildebrandtia ornata</i>			
CHORDATA/AMPHIBIA	<i>Hoplobatrachus occipitalis</i>			
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Hyaena hyaena</i>			
CHORDATA/MAMMALIA	<i>Tragelaphus scriptus</i>			
CHORDATA/REPTILIA	<i>Varanus niloticus</i>			
CHORDATA/ACTINOPTERYGII	<i>Citharinus citharus</i>			
CHORDATA/ACTINOPTERYGII	<i>Malapterurus minjirya</i>			
CHORDATA/ACTINOPTERYGII	<i>Oreochromis niloticus</i>			
CHORDATA/AVES	<i>Ciconia abdimii</i>			
CHORDATA/AVES	<i>Francolinus bicalcaratus</i>			
CHORDATA/AVES	<i>Vanellus spinosus</i>			

Boîte de texte optionnelle pour fournir d'autres informations

Il n'a pas été recensé d'espèces animales envahissantes sur le site. Sur le site, on rencontre des espèces remarquables telles que le vautour charognard (en danger critique), aigle martial, le pélican, l'aigrette, etc. Le site compte également plus de 30 espèces d'oiseaux migrateurs tels que *Butastur rufipennis*, *Circus aeruginosus aeruginosus*, *Circus macrourus*, *Circus pygargus*, *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus*, etc. Les inventaires réalisés en 2025 dans la Forêt Classée du Barrage de Ouagadougou mettent en évidence une forte présence de l'avifaune. Au total, 161 espèces d'oiseaux ont été recensées, réparties entre 120 genres et 59 familles (Tableau 16). La communauté aviaire est largement dominée par des espèces telles que *Laniarius barbarus* (Gonolek de Barbarie), *Vidua chalybeata* (Combassou du Sénégal), *Spilopelia senegalensis* (Tourterelle maillée) et *Crinifer piscator* (Touraco gris). Du point de vue taxonomique, les genres les plus représentés incluent *Lamprotornis* avec 4 % du total des espèces identifiées, suivi des genres *Ardea*, *Cinnyris*, *Acrocephalus*, *Circus*, *Clamator*, *Falco*, *Lanius*, *Ploceus*, et *Tringa*, chacun regroupant entre 2 % du total des espèces identifiées (en annexe). Les familles les plus abondantes sont les *Accipitridae*, *Ardeidae*, *Nectariniidae*, *Cuculidae*, *Estrildidae*, *Muscicapidae*, *Ploceidae*, *Scolopacidae*, *Cisticolidae*, *Columbidae* et *Sturnidae* représentant entre 4 % et 8 % du nombre total d'espèces observées dont *Necrosystes monachus*.

4.4 - Éléments physiques

4.4.1 - Climat

Région	Sous-région climatique
A: Climat tropical humide	Aw: Savane tropicale (Hiver sec)

Le climat de la région du Kadiogo est de type tropical sec à saisons contrastées séparées par deux saisons de transition. La saison humide ou saison des pluies dure de juin à septembre et concentre près de 80% des pluies et plus de 65% des jours de pluie. Cette saison est remplacée par la saison humide et fraîche de transition entre octobre et novembre (PAF, 2025). Les températures ont des minima qui varient entre 21 et 25°C et des maxima moyens qui varient entre 35 et 39°C. La seconde saison principale est la saison sèche et fraîche où on n'enregistre pratiquement pas de précipitations. Sa caractéristique majeure est l'apparition de l'harmattan, un vent sec accompagné de brume sèche très opaque le matin. En revanche la seconde saison de transition (avril-mai) est chaude et se distingue par ses fortes températures généralement supérieures à 35°C avec des pics atteignant 40°C.

4.4.2 - Cadre géomorphologique

a) Élévation minimum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

a) Élévation maximum au-dessus du niveau de la mer (en mètres)

Bassin hydrologique entier ☐

Partie supérieure du bassin hydrologique ☐

Partie moyenne du bassin hydrologique ☒

Partie inférieure du bassin hydrologique ☐

Plus d'un bassin hydrologique ☐

Pas dans un bassin hydrographique ☐

Côtier ☐

Veuillez donner le nom du ou des bassins hydrographiques. Si le site se trouve dans un sous-bassin, indiquer aussi le nom de la plus grande rivière du bassin. Pour un site côtier/marin, indiquer le nom de la mer ou de l'océan.

Le complexe des trois barrages et du Parc Urbain Bāngr Weoogo est localisé dans le sous bassin versant de Massili. Ce bassin versant est une des cinq unités de bassin qui constituent les principaux affluents du grand sous bassin versant de Nakanbé dont la superficie est de 41407 km2 GIRE, (2001).

4.4.3 - Sol

Minéral ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Organique ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Pas d'information disponible ☐

Les types de sols sont-ils sujets aux changements par suite de changements dans les conditions hydrologiques (p. ex., salinité ou acidification accrues)? Oui ☐ Non ☒

Veuillez fournir d'autres informations sur les sols (optionnel)

Sur le plan pédologique, AEN, 2013 distingue quatre types principaux de sols dans le sous bassin versant de Massili :
- les sols ferrugineux lessivés généralement associés à des sols gravillonnaires ;
- les sols peu évolués d'érosion installés sur des granites et des migmatites ;
- les sols halomorphes à structure dégradée et ;
- les sols minéraux bruns

4.4.4 - Régime hydrologique

Permanence de l'eau

Présence?	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Généralement de l'eau permanente présente	Aucun changement
Habituellement de l'eau présente de manière saisonnière, éphémère ou intermittente	Aucun changement

Source d'eau qui maintient les caractéristiques du site

Présence?	Source d'eau prédominante	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Alimenté par les précipitations	☒	Aucun changement
Alimenté par l'eau de surface	☒	Aucun changement

Destination de l'eau

Présence?	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Vers un bassin versant en aval	Aucun changement

Stabilité du régime hydrologique

Présence?	Changements au moment de la mise à jour de la FDR
Niveaux d'eau fluctuants (y compris marée)	Aucun changement

Ajouter tout commentaire sur le régime hydrologique et ses déterminants (s'il y a lieu). Utiliser cette boîte pour expliquer les sites ayant une hydrologie complexe:

Le site RAMSAR est traversé par le cours d'eau Kadiogo, qui se jette dans le Massili, un affluent du Nakanbé. Les axes de drainage du Nakanbé ne coulent que pendant la saison des pluies. Ils sont caractérisés par des écoulements intermittents pouvant se produire en mai mais ce n'est qu'en juillet-août- septembre que les débits deviennent réguliers. Ces débits se renforcent de l'amont vers l'aval pour atteindre à Bagré une valeur moyenne de 65,4 m3/s en juillet, 145 m3/s en août et 107 m3/s en Septembre. Ces trois mois représentent 88% des écoulements annuels. Le réseau hydrographie couvre un bassin versant de 38 897 ha.

(ECD) Connectivité des eaux de surface et des eaux souterraines

Les eaux de surfaces alimentent les aquifères dans le bassin versant du Nakanbé

4.4.5 - Régime de sédimentation

Une érosion importante de sédiments se produit dans le site ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Un transport important de sédiments se produit dans ou à travers le site ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Le régime de sédimentation est très variable, soit saisonnièrement, soit d'une année à l'autre ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Le régime de sédimentation est inconnu ☐

Donner toute autre information sur les sédiments (optionnel):

Le profil topographique présente une altitude moyenne de 300 m avec une pente d'une valeur moyenne comprise entre 0,5 et 9% orientée sud-nord-est. Les pentes les plus faibles (<1%) occupent 85,31% de l'espace urbain. Les gradients de pente étant propices à la formation de ruissellement des eaux, ceux-ci exposent les sols à l'érosion. L'ensablement des barrages 1, 2 et 3 de Ouagadougou est un problème majeur. L'accumulation de sédiments (sable, boue et déchets solides) au fond des barrages est principalement causée par l'érosion des sols dans les bassins versants, les activités humaines comme le maraîchage sur les berges et la pollution. Ce phénomène d'activation représente une menace naturelle et anthropique durable. L'érosion des sols et le transport des sédiments jusque dans les retenues accélèrent le colmatage progressif des barrages. La sédimentation réduit la profondeur maximale, en particulier au barrage numéro 3 dont la profondeur est limitée à environ 15 mètres.

(ECD) Température de l'eau

Températures barrages N°2: 35,3 et N°3: 32,7 mai-juin 2024 (DGRE, 2024)

4.4.6 - pH de l'eau

Environ neutre (pH: 5,5-7,4) ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Inconnu ☐

Fournir d'autres informations sur le pH (optionnel):

Le barrage N°2 présente un pH de 6,9 donc voisin de la neutralité. (DGRE, 2024)

4.4.7 - Salinité de l'eau

Douce (<0,5 g/l) ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Inconnu ☐

Veuillez fournir d'autres informations sur la salinité (optionnel):

Le barrage N°2 présente une salinité de 0,03 g/l (DGRE, 2024)

4.4.8 - Matières nutritives dissoutes ou en suspension dans l'eau

Eutrophe ☒

(Mise à jour) Changements au moment de la mise à jour de la FDR Pas de changement ☒ Augmentation ☐ Diminution ☐ Inconnu ☐

Inconnu ☐

Veuillez fournir d'autres informations sur les matières nutritives dissoutes ou en suspension (optionnel):

Les rejets d'eaux usées domestiques non traitées et le drainage des déchets solides conduisent à un enrichissement excessif des eaux en nutriments, notamment en phosphore et en azote. Ce phénomène est un moteur majeur de la dégradation de l'écosystème.

(ECD) Conductivité de l'eau

De mai à juin, la conductivité des barrages N° 2 et N° 3 sont respectivement de 273 µS/cm et 363 µS/cm. (DGRE, 2024)

4.4.9 - Caractéristiques de la région environnante qui pourraient affecter le site

Veuillez décrire si, et dans ce cas comment, le paysage et les caractéristiques écologiques de la région environnant le Site Ramsar i) essentiellement semblables ☐ ii) significativement différentes ☒ différent de ceux du site lui-même:

La région environnante présente une urbanisation ou un développement plus important ☒

La région environnante a une densité de population humaine plus élevée ☒

Dans la région environnante, il y a une utilisation agricole plus intense ☒

La région environnante a des types de sols ou des types d'habitats ☒ significativement différents

Décrive d'autres raisons pour lesquelles la région environnante est différente:

La région environnante est marquée par une forte urbanisation.

Plusieurs activités sont menées autour du site :

☐ Les activités agricoles dominantes autour de la zone humide sont axées principalement sur le maraîchage. Ces pratiques sont concentrées autour des trois barrages de la ville. Les cultures les plus courantes incluent la tomate, la laitue, l'oignon, l'aubergine, le gombo, entre autres.

☐ Les activités sylvicoles notables sont entre autres la production de plantes forestières locales, exotiques ou ornementales, réalisée par des pépiniéristes implantés tout autour de la forêt.

A ces productions agro-sylvicoles, s'ajoutent les activités telles que le commerce et les bâtiments et travaux publics qui exploitent l'eau des barrages.

4.5 - Services écosystémiques

4.5.1 - Services/avantages écosystémiques

Services d'approvisionnement

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Aliments pour les êtres humains	Subsistance pour les humains (p. ex., poissons, mollusques, céréales)	Élevé
Eau douce	Eau potable pour les humains et/ou le bétail	Moyen
Eau douce	Eau pour agriculture irriguée	Élevé

Services de régulation

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Maintien des régimes hydrologiques	Recharge et évacuation des eaux souterraines	Moyen
Protection contre l'érosion	Rétention des sols, sédiments et matières nutritives	Élevé
Maîtrise de la pollution et détoxification	Épuration de l'eau/traitement ou dilution des déchets	Élevé
Régulation du climat	Régulation du climat local/atténuation des changements	Élevé
Régulation du climat	Régulation des gaz à effet de serre, de la température, des précipitations et autres processus climatiques	Élevé
Contrôle biologique des ravageurs et maladies	Soutien aux prédateurs de ravageurs agricoles (p. ex., oiseaux qui se nourrissent de criquets)	non applicable au site
Prévention des risques	Maîtrise des crues, stockage des eaux de crues	Élevé

Services culturels

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Signification
Loisirs et tourisme	Pique-niques, sorties, excursions	Élevé
Loisirs et tourisme	Observation de la nature et tourisme dans la nature	Moyen

Services d'appui

Services écosystémiques	Exemples	Importance/Étendue/Importance
Biodiversité	Soutient une diversité de formes de vie, notamment des plantes, des animaux et des microorganismes, les gènes qu'ils contiennent et les écosystèmes dont ils font partie	Élevé

Autre(s) service(s) écosystémique(s) non inclus ci-dessus:

L' emplacement du site à l'intérieur de la ville de Ouagadougou en fait un lieu privilégié pour les activités d'éducation environnementale, de recherche scientifique et de sensibilisation du public à la conservation des zones humides. Ce rôle pédagogique et scientifique renforce encore son importance stratégique.

En somme, la FCBO possède un potentiel de conservation élevé, tant pour sa biodiversité ordinaire que pour la sauvegarde d'espèces menacées. Ce potentiel justifie pleinement la mise en œuvre d'actions de gestion durable, de suivi écologique renforcé, et de valorisation du site comme modèle d'interface entre nature et urbanisation.

Le site Ramsar à travers sa forêt constitue un dispositif de brise vent et de rétention de la poussière qui assure la protection de la ville contre les vents violents.

Dans le site: 1000000

En dehors du site: 2 000 000

Des études ou des évaluations ont-elles été faites de la valorisation

économique des services écosystémiques fournis par ce Site ☐ Oui ☐ Non ☒ Inconnu ☐

Ramsar?

4.5.2 - Valeurs culturelles et sociales

- i) le site fournit un modèle pour l'utilisation rationnelle des zones humides, démontrant l'application de connaissances et de méthodes traditionnelles de gestion et d'utilisation qui maintiennent les caractéristiques écologiques de la zone humide ☒

Description, s'il y a lieu

Autrefois, propriété de l'Empereur des Moosé, le parc est géré traditionnellement par les habitants de Toukin, dans l'Arrondissement N°4 et sous l'autorité du chef de Sourgou, village situé entre Koudougou et Saabou. On note la présence d'objets, d'animaux sacrés et vénérés. Les espèces totémiques sont : Python sebae Gmelin (python), Crocodylus suchus Laurenti (crocodile), Varanus niloticus Linnaeus (varan).

- ii) le site a des traditions culturelles exceptionnelles ou des vestiges d'anciennes civilisations qui ont influencé les caractéristiques écologiques de la zone humide ☒

Description, s'il y a lieu

Ancienne propriété de Mogho Naaba, le FCBO est un site culturel et des pratiques coutumières y sont menées chaque année. Elle fait partir des bois sacrés du Burkina Faso. Les bois sacrés sont des formes de conservation de la diversité biologique.

- iii) les caractéristiques écologiques de la zone humide dépendent de l'interaction avec les communautés locales ou les peuples autochtones ☒

Description, s'il y a lieu

Les communautés locales entretiennent des relations très étroites avec le parc. En effet, Il représente un site à fortes valeurs culturelles et des pratiques ancestrales toujours d'actualité contribuent à maintenir les caractéristiques écologiques du site en plein coeur de la ville de Ouagadougou

- iv) des valeurs non matérielles pertinentes telles que des sites sacrés sont présentes et leur existence est étroitement liée au maintien des caractéristiques écologiques de la zone humide ☒

Description, s'il y a lieu

A l'approche de chaque saison hivernale, une cérémonie coutumière (le sigri-maongo), a lieu pour demander aux ancêtres d'intercéder auprès de Dieu pour la santé, le bonheur, la paix et une bonne pluviométrie au Burkina Faso. Ce rite, qui consacre le sacrifice de poulets et de moutons dans les "lieux saints" de cette forêt, est également une occasion pour de nombreuses personnes de formuler des vœux particuliers.

4.6 - Processus écologiques

(ECD) Productivité de la végétation, pollination, processus de régénération, succession, rôle des feux, etc.	La présence de pollinisateurs nombreux et variés (abeilles, insectes) et la dispersion des graines par les chauves-souris et les oiseaux contribuent à la régénération naturelle des espèces végétales au sein du site Ramsar
(ECD) Interactions notables entre espèces, y compris pâturage, prédation, concurrence, maladies et agents pathogènes	La présence des oiseaux migrateurs est source de propagation des épizooties. Le pâturage y est interdit, cependant il y a compétition entre herbivores pour les espèces apâtées.
(ECD) Aspects notables concernant la dispersion des plantes et des animaux	La présence des graines d'arbres dans la fumure organique, notamment de celle des petits ruminants (waterbuck) favorisent la dispersion des plantes. Il en est de même que la présence des fructivores notamment les roussettes et des oiseaux migrateurs.
(ECD) Pressions et tendances concernant tout ce qui précède et/ou concernant l'intégrité écosystémique	Perturbations dues à la construction de routes, de bâtiments et de surfaces bétonnées, la réalisation de l'échangeur du Nord, les rejets d'eaux usées domestiques, les déchets solides, les inondations, la sédimentation, l'agriculture urbaine.

5 - Comment est géré le site? (Conservation et gestion)

5.1 - Régime foncier et responsabilités (Administrateurs)

5.1.1 - Régime foncier/propriété

Propriété publique

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Gouvernement fédéral/national	☒	☒

Propriété privée

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Commercial (entreprise)	☐	☒
Fondation/ organisation non gouvernementale/ fonds	☐	☒
Autres types de propriétaire(s) privé(s)/ individuel(s)	☐	☒

Autre

Catégorie	Dans le Site Ramsar	Dans la zone environnante
Propriétés communes/ droits coutumiers	☒	☒

Fournir d'autres informations sur le régime foncier / régime de propriété (optionnel):

Le site est situé en plein centre urbain de la commune de Ouagadougou. Les autochtones sont constitués essentiellement des moossé qui assurent les aspects coutumiers du site. De façon traditionnelle les terres en pays mossi sont gérées par les chefs de terre qui donnent à chaque chef famille une portion de terre pour l'exploitation. Les étrangers obtiennent les terres sous forme de prêt et elles leur peuvent être retirées à tout moment par les propriétaires terriens. Cependant sur le plan administratif la terre appartient à l'Etat. Raison pour laquelle tout autour du site a été lotis et mis à la disposition de la population.

5.1.2 - Organe de gestion

Indiquer le bureau local / les bureaux locaux de toute agence ou organisation responsable de la gestion du site:

Direction des Aménagements Paysagers et de la Gestion des Parcs (DAPGP)

Donner le nom et/ou le poste de la personne ou des personnes responsable(s) de la zone humide:

KOUDOUGO Boureima

Adresse postale:

01 BP 85 OUAGADOUGOU 01

Adresse de courriel:

boureimakoudougou@yahoo.fr

5.2 - Menaces aux caractéristiques écologiques et réponses (gestion)

5.2.1 - Facteurs (actuels ou probables) touchant défavorablement les caractéristiques écologiques du site

Établissements humains (non agricoles)

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Logement et zones urbaines	Impact élevé	Impact moyen	☐	Aucun changement	☒	Aucun changement
Zones commerciales et industrielles	Impact élevé	Impact élevé	☐	Aucun changement	☒	Aucun changement
Tourisme et zones de loisirs	Impact moyen	Impact moyen	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Régulation de l'eau

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Canalisation et régulation des cours d'eau	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Agriculture et aquaculture

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Aquaculture marine et d'eau douce	Faible impact	Faible impact	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Corridors de transport et de service

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Routes et voies ferrées	Impact moyen	Impact moyen	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Utilisation des ressources biologiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Prélèvement de plantes terrestres	Impact moyen	Faible impact	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement
Pêche et prélèvement de ressources aquatiques	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Intrusions et perturbations anthropiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Activités de loisirs et de tourisme	Impact moyen	Impact moyen	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Modifications au système naturel

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Barrages et utilisation/gestion de l'eau	Impact moyen	Impact moyen	☒	Aucun changement	☐	Aucun changement

Gènes et espèces envahissantes et problématiques

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Espèces exotiques/ non indigènes envahissantes	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Pollution

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Eaux usées domestiques, eaux usées urbaines	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Effluents industriels et militaires	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Déchets solides et ordures	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Changements climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes

Facteurs qui touchent le site de façon négative	Menace réelle	Menace potentielle	Dans le site	Changements	Dans la zone environnante	Changements
Déplacement et modification de l'habitat	Impact élevé	Impact élevé	☐	Aucun changement	☒	Aucun changement
Sécheresses	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Températures extrêmes	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement
Tempêtes et crues	Impact élevé	Impact élevé	☒	Aucun changement	☒	Aucun changement

Le site est situé dans le centre urbain de Ouagadougou. Avec l'urbanisation galopante, plusieurs facteurs défavorables affectent le site. Les plus remarquables sont les polluants des activités humaines telles que le maraîchage, la production des plants en pépinière, le lavage des véhicules (surtout les poids lourds), les maquis – restaurants et les déchets solides et liquides produits par les citoyens.

5.2.2 - Statut légal de conservation

Inscriptions nationales légales

Type d'inscription	Nom de la région	Information en ligne url	Recouvrement avec le Site Ramsar
Forêt classée du barrage de Ouagadougou	Kadiogo	http://bf.geoview.info/m/foret_c_lassee_du_barrage,2362738	partiellement

5.2.3 - Catégories d'aires protégées UICN (2008)

Ia Réserve naturelle intégrale ☐

Ib Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement pour la protection de la nature sauvage ☐

II Parc national: aire protégée gérée principalement pour la protection des écosystèmes et les loisirs ☒

III Monument naturel: aire protégée gérée principalement pour la conservation de caractéristiques naturelles spécifiques ☐

IV Zone de gestion des habitats/espèces: aire protégée gérée principalement pour la conservation dans le cadre d'une intervention de gestion ☐

V Paysage terrestre/marin protégé: aire protégée gérée principalement pour la conservation du paysage terrestre/marin et les loisirs ☐

VI Aire protégée de ressource gérée: aire protégée gérée principalement pour l'utilisation durable des écosystèmes naturels ☐

5.2.4 - Mesures de conservation clés

Protection juridique

Mesures	état
Protection juridique	Appliquées

Habitat

Mesures	état
Amélioration de la qualité de l'eau	Appliquées
Gestion/restauration hydrologique	Partiellement appliquées
Contrôles du changement d'affectation des terres	Appliquées
Initiatives/contrôles de la gestion des bassins versants	Appliquées
Manipulation/amélioration de l'habitat	Appliquées
Replantation de la végétation	Appliquées
Gestion des sols	Appliquées
Corridors/passages pour la faune	Appliquées

Espèces

Mesures	état
Programmes de gestion d'espèces menacées/rares	Proposées
Contrôle des plantes exotiques envahissantes	Partiellement appliquées
Réintroduction	Partiellement appliquées

Activités anthropiques

Mesures	état
Régulation/gestion des activités récréatives	Appliquées
Activités de communication, éducation, sensibilisation et participation	Appliquées
Recherche	Appliquées
Gestion du prélèvement/de l'exploitation de l'eau	Partiellement appliquées
Contrôles du prélèvement/ application des mesures de lutte contre le braconnage	Appliquées
Gestion/exclusion du bétail (exclusion des pêcheries)	Partiellement appliquées
Régulation/gestion des déchets	Partiellement appliquées

Autre:

Les acteurs autour du site sont organisés en groupement ou en association de maraîchers, de pépiniéristes, de pêcheurs. Le parc est administré par une direction générale sous couverte de la mairie de Ouagadougou qui veille à la protection et à la conservation de la diversité biologique. Elle est accompagnée par :

- Un comité de gestion représenté par les élus locaux de la commune et des habitants des quartiers riverains ;
- Un comité technique et scientifique qui assure la sauvegarde du caractère scientifique et éducatif du parc
- Le pouvoir traditionnel qui veille à la sauvegarde du caractère naturel, culturel et sacré du parc.

5.2.5 - Plan de gestion

Y a-t-il un plan de gestion spécifique pour le site? Oui

Une évaluation de l'efficacité de la gestion a-t-elle été entreprise pour le site? Oui ☒ Non ☐

Si le site est un site transfrontière officiel comme indiqué dans la section Admin. et limites > Localisation du site, y a-t-il des processus de planification de la gestion communs avec une autre Partie contractante? Oui ☐ Non ☒

Indiquer si un centre Ramsar, un autre centre pédagogique ou d'accueil des visiteurs, ou un programme d'éducation ou pour les visiteurs, est associé au site:

Le site dispose d'un centre d'éducation environnementale qui a un impact important pour la sensibilisation des scolaires, des étudiants et partant de toute la population. Un personnel expérimenté assure l'animation du centre et le guidage des touristes. Le potentiel pédagogique du site est très important en ce sens qu'il permet aux étudiants d'être en contact avec la forêt, les champs du maraîchage pour les besoins de recherche.

URL de la page web liée au site (le cas échéant): <http://www.mairie-ouaga.bf>

5.2.6 - Plan de restauration

Y a-t-il un plan de restauration spécifique au site? Oui, il y a un plan

5.2.7 - Suivi mis en œuvre ou proposé

Suivi	état
Qualité des sols	Proposé
Communautés végétales	Appliqué
Espèces végétales	Appliqué
Communautés animales	Appliqué
Suivi du régime hydrologique	Proposé
Qualité de l'eau	Appliqué
Oiseaux	Proposé
Espèces animales (veuillez préciser)	Appliqué

Le site Ramsar est un laboratoire à ciel ouvert. Les autorités l'ont destiné, à être un temple du savoir, un pôle d'expérimentation, de recherche au besoin de la science. De nombreux travaux scientifiques sont issus du parc. Des efforts sont consentis par la direction du parc pour préserver ses caractéristiques écologiques. Au nombre de ses efforts, on peut citer les activités de reboisement, d'introduction et de suivi des espèces animales, et végétales.

6 - Document additionnel

6.1 - Rapports et documents additionnels

6.1.1 - Références bibliographiques

BONDAZ (J), 2011, parc urbaine et patrimoine naturel en Afrique de l'ouest de la période coloniale au cinquantenaire des indépendances in Géographie et culture in Géographie et cultures : patrimonialisation en Afrique ; 13 p.

SOULAMA (D), 2013, Diagnostic conjoint du sous Bassin du Massili : état des lieux de gestion en vue de la mise en place d'un comité local de gestion, 61p.

Atlas de la biodiversité de l'Afrique de l'Ouest, Tome II, Burkina Faso 122 – 152 pp.

Gnoumou (A), Thiombiano (A), Hahn – Hadjali (K), Adouabou (B), Sarr (M) et GUINKO (S), 2008, Le parc urbain bangr weoogo: une aire de conservation de la diversité floristique au Coeur de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso, 48p.

Agence de l'Eau de Nakanbé, 2013, Rapport de la rencontre de visite des services techniques sur les problématiques d'utilisation et de gestion durable des barrages n°1, 2 et de Ouagadougou, 11p.

GHAM – BOH (N. F), 2010, GIRE et réduction de la pauvreté à Ouagadougou, Burkina Faso : Etude de la valeur économique de l'eau du barrage n°1, Mémoire de Master spécialisé en gestion intégrée des ressources en eau, 73p.

Savadogo (S), Ouedraogo (A) et THIOMBIANO (A), 2011, Diversité et enjeux de conservation des bois sacrés en société Mossi (Burkina Faso) face aux mutations socioculturelles actuelles. Revue de international journal of Biological and Chemical Sciences 5 (4) 1639 – 1658, August 2011 20p.

OUEDRAOGO/BELEM (M), 1997, Etude floristique et phytosociologique du parc zoologique de la forêt classée du barrage de Ouagadougou

GNOUMOU (A), 2007, Etude de la flore et de la végétation du Parc Urbain Bangr Weoogo (Ouagadougou, Burkina Faso)

KAMBOU (S), DIALLO (A), 1998, inventaire de la diversité floristique et l'aménagement du jardin botanique de la forêt classée du barrage de Ouagadougou

Agence de l'Eau de Nakanbé, 2014, Atelier d'échange des acteurs sur la gestion durable des barrages n° 1, 2 et 3 de Ouagadougou ; Rapport final, 46p.

GIRE, 2001, Etat des lieux des ressources en eau du Burkina Faso et de leur cadre de gestion, version finale. 241p.

GUENGANT (J – p), LANKOANDE (M), TAPSOBA (T. V. M. E.), ZANOU (B), 2009 Thème 16 : Projections démographique 2007 – 2050, 108 p.

MEDD, 2013, Politique Nationale sur les Zones Humides, 26p.

W

YAMEOGO (S), BLAVOUX (B), SAVADOGO (A. N), l'eau souterraine dans des problématiques urbaines diverses : qualité et vulnérabilité des ressources en eau souterraine du centre urbaine de Ouagadougou au Burkina Faso. Revue de géologue n°167.

ZONGO (M), 2013, Contribution du parc urbain bangr weoogo dans la cnservation de la phytodiversité du Burkina Faso.

6.1.2 - Rapports et documents additionnels

i. listes taxonomiques d'espèces de plantes et d'animaux présents dans le site (voir section 4.3)

<2 fichier(s)>

ii. une Description détaillée des caractéristiques écologiques (DCE) (dans un format national)

<no file available>

iii. une description du site dans l'inventaire national ou régional des zones humides

<no file available>

iv. rapports relevant de l'article 3.2

<no file available>

v. plan de gestion du site

<1 fichier(s)>

vi. autre littérature publiée

<2 fichier(s)>

6.1.3 - Photographie(s) du site

Fournir au moins une photographie du site:



Vue des lacs des barrages (Arzounbila PEDABGA, 08-10-2018)



Forêt ripicole sur les berges des barrages (Arzounbila PEDABGA, 09-10-2018)



Le vautour charognard à l'intérieur de la FCBO (KOUDOUGOU Boureima, 12-07-2025)



Population de waterbuck à l'intérieur de la FCBO (Serges, 16-11-2024)



Crocodile à l'intérieur de la FCBO (KOUDOUGOU Boureima, 12-07-2025)



Cours d'eau naturel à l'intérieur de la FCBO (KOUDOUGOU Boureima, 12-07-2025)



Pépinière à l'intérieur de la FCBO (KOUDOUGOU Boureima, 12-07-2025)

6.1.4 - Lettre d'inscription et données correspondantes

Lettre d'inscription

<1 fichier(s)>

Date d'inscription 2019-02-02